



BLANONE® STICK

PACK REF
900332-0
Rev.0 - Dec. 1, 2015



Ingredients / Ingredienti / Zusammensetzung / Composition / Composición

glycerin, propylene glycol, carbamide peroxide, deionized water, carbomer, aroma, disodium EDTA, limonene, sodium saccharin, sodium hydroxide.



Teeth whitening pen



BlancOne® STICK is a home teeth whitening treatment.
Used for two weeks, it will make your smile brighter and whiter.
Ideal for removing stains from tobacco, coffee, tea
as well as pigmented foods and beverages.

Suitable for long-term maintenance of in-office professional teeth whitening results.

USE INSTRUCTIONS

Apply once a day for a cycle of 14 consecutive days, preferably in the evening before bedtime.

- 1) Clean your teeth by brushing.
- 2) Remove the cap and turn the bottom of the pen (3-4 clicks) clockwise to wet the brush with a quantity of gel. (IMPORTANT NOTE: during the first use more clicks may be required in order to break the safety seal).
- 3) Apply the gel on the teeth and rub thoroughly on their surface for 2 minutes. During this period, regularly rewet the brush with a new quantity of gel, turning the bottom clockwise and reapply. Usually 10-12 clicks are needed to apply an adequate amount of whitening gel per procedure.
- 4) Spit out the remaining gel without rinsing with water and do not eat or drink anything for 30 minutes.
- 5) After the end of the procedure clean the silicon brush with a tissue and recap the pen.

If used as a standalone treatment, after completing a 14-day cycle, stop use for 2 weeks and then repeat a second cycle of 14 consecutive days.

If used for maintenance, repeat a 14-day cycle 3 months after the first one.

WARNINGS

- 6% of H₂O₂ is released.
- Not to be used on anyone under 18 years of age.
- To be sold only to dental practitioners. For each use cycle, the first application must be done only by dental practitioners or un-

der their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards the product will be provided to the consumer to complete the use cycle.

- Keep the product out of children's reach.
- Avoid contact with the eyes. In case of contact rinse eyes carefully with water for several minutes and request medical advice/attention.
- Do not apply quantities greater than those required for the whitening process. If swallowed in small quantities the product is harmless, otherwise consult a doctor.
- Some users may experience sensitivity or gingival irritation. While these are mild and transient in most cases, sometimes treatment by a dentist may be required.
- Do not use longer than 14 consecutive days; a 2-week stop is recommended between each application cycle (14 days).

PRECAUTIONS

- A dental examination is mandatory prior to bleaching.
- Bleaching will not lighten porcelain crowns and dental restorations.
- For at least 6 hours after the bleaching procedure do not use tobacco products and do not drink coffee or red wine.
- Not intended for use by pregnant women. Consult a doctor if you are breast feeding.
- Avoid contact with tissues other than teeth.
- Acidic foods/juices may cause sensitivity if consumed shortly after bleaching.
- Gum tissue irritation may result if used in individuals with periodontal disease.
- If any irritation of gums or tooth sensitivity occurs, discontinue the use of the product and consult your dentist.





BLANCONE
STICK

Penna sbiancante per denti



BL

BlancOne® STICK è un trattamento sbiancante per uso domiciliare. Utilizzata per un ciclo di due settimane, ripristina la brillantezza e la luminosità del sorriso. Ideale per rimuovere macchie da nicotina, caffè, tè, cibi e bevande pigmentanti. Indicata per mantenere più a lungo i risultati dello sbiancamento professionale alla poltrona.

ISTRUZIONI D'USO

Applicare una volta al giorno per un ciclo di 14 giorni consecutivi, preferibilmente alla sera prima di andare a letto.

- 1) Lavarsi i denti con lo spazzolino.
- 2) Rimuovere il cappuccio e ruotare la base della penna in senso orario (3-4 scatti) per inumidire lo spazzolino con una quantità di gel. (NOTA IMPORTANTE: al primo utilizzo possono essere necessari più scatti per rompere il sigillo di sicurezza).
- 3) Applicare il gel sui denti e strofinare a fondo la superficie per 2 minuti. In questa fase, inumidire regolarmente lo spazzolino con una nuova quantità di gel, ruotando la base in senso orario, e riapplicarlo. Sono necessari, di solito, 10-12 scatti per applicare un'adeguata quantità di gel sbiancante per trattamento.
- 4) Sputare il gel rimanente senza risciacquare e non assumere cibi o bevande per 30 minuti.
- 5) Al termine del trattamento, pulire lo spazzolino di silicone con un fazzoletto di carta e rimettere il cappuccio alla penna.

Se utilizzato come trattamento indipendente, dopo un ciclo di 14 giorni, interrompere l'uso per 2 settimane e quindi ripetere un secondo ciclo di 14 giorni consecutivi.

Se utilizzato come mantenimento, ripetere un ciclo di 14 giorni, 3 mesi dopo il primo.

AVVERTENZE

- Rilascio del 6% di H2O2.
- Non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
- Da vendere esclusivamente a professionisti odontoiatrici. In ciascun ciclo, il primo utilizzo deve essere effettuato soltanto da professionisti odontoiatrici o sotto la loro supervisione diretta se è garantito un equivalente livello di

sicurezza. In seguito sarà fornito al paziente per completare il ciclo di utilizzo.

- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti e consultare un medico.
- Non ingerire quantità superiori a quelle richieste per il processo di sbiancamento. Se ingerito in piccole quantità, il prodotto non è dannoso, altrimenti consultare un medico.
- Alcuni pazienti possono sperimentare sensibilità o irritazione gengivale. Si tratta generalmente di effetti leggeri e transitori, ma in alcuni casi potrebbero richiedere il trattamento del dentista.
- Non utilizzare per più di 14 giorni consecutivi; si raccomanda un'interruzione di 2 settimane tra ogni ciclo di applicazione (14 giorni).

PRECAUZIONI

- Prima dello sbiancamento è necessario un esame odontoiatrico.
- Lo sbiancamento non ha effetto su corone di porcellana e ricostruzioni dentali.
- Non utilizzare prodotti con tabacco; non bere caffè o vino rosso dopo il processo di sbiancamento per almeno 6 ore.
- Non indicato per donne in stato interessante. Durante l'allattamento, consultare un medico.
- Evitare il contatto con tessuti diversi dai denti.
- Cibi/succhi acidi possono provocare sensibilità se consumati subito dopo lo sbiancamento.
- Può presentarsi irritazione al tessuto gengivale se impiegato su persone con patologia parodontale.
- Se si presenta irritazione gengivale o sensibilità dentale, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare il dentista.

Zahn-Aufhellungsstift



BlancOne® STICK ist eine Aufhellbehandlung für den Gebrauch zu Hause. Der zweiwöchige Gebrauch stellt das strahlend weiße Lächeln wieder her. Einfach ideal zum Entfernen von Flecken durch Nikotin, Kaffee, Tee und pigmenthaltige Getränke/Nahrung. Perfekt geeignet zur Ergebnisverlängerung nach der professionellen Aufhellung in der Zahnarztpraxis.

GE BRAUCH

Einmal täglich an 14 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst abends vor dem Schlafengehen anwenden.

- 1) Die Zähne mit der Zahnbürste putzen.
- 2) Die Verschlusskappe entfernen und den Stiftring im Uhrzeigersinn (3-4 Klicks) drehen, um die Bürste mit einer entsprechenden Gelmenge zu befeuchten.

WICHTIGE ANMERKUNG: Beim ersten Gebrauch können zum Bruch des Sicherheitssiegels mehrere Klicks erforderlich sein).

- 3) Das Gel auf die Zähne auftragen und die Zahnoberfläche gründlich 2 Minuten bürsten. In dieser Phase regelmäßig die Bürste mit einer neuen Gelmenge befeuchten, dazu den Ring im Uhrzeigersinn drehen

und das Gel erneut auftragen. Normalerweise sind 10-12 Klicks erforderlich, um eine entsprechende Menge Aufhellgel für die Behandlung auftragen zu können.

- 4) Zurückbleibendes Gel ohne zu spülen ausspucken und für den Zeitraum von 30 Minuten weder Nahrung noch Getränke aufnehmen.
- 5) Nach Behandlungsende die Silikonbürste mit einem Papiertuch säubern und die Verschlusskappe erneut auf den Stift setzen.

Bei Gebrauch als unabhängige Behandlung ist nach einem 14-tägigen Zyklus die Anwendung für 2 Wochen auszusetzen. Anschließend einen weiteren, zweiten 14-tägigen Behandlungszyklus wiederholen.

HDS



BLANCONE
STICK

Zahn-Aufhellungsstift



Bei Gebrauch zur Ergebnisstabilisierung einen 14-tägigen Zyklus 3 Monate nach dem ersten erneut durchführen.

HINWEISE

- Freisetzung von 6% H2O2.
- Nicht bei Patienten unter 18 Jahren verwenden.
- Verkauf ausschließlich an zahnärztliche Einrichtungen. Bei jedem Zyklus darf die Erstbehandlung allein durch Zahnärzte oder unter ihrer direkten Aufsicht, falls ein entsprechender Sicherheitsstandard gegeben ist, erfolgen. Im späteren Verlauf wird dem Patienten zur Zyklusfertigstellung der Stick ausgehändigt.
- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Den Augenkontakt vermeiden. Im Falle eines Kontaktes die Augen umgehend mit reichlich Wasser sorgfältig mehrere Minuten spülen und einen Facharzt aufsuchen
- Keinesfalls größere Mengen als die, die für den Aufhellzyklus erforderlich sind, verschlucken. Bei Verschlucken geringer Mengen: Das Produkt ist nicht schädlich, andernfalls einen Arzt aufsuchen.
- Manche Patienten können empfindlich oder mit Zahnfleischreizung reagieren. Im Allgemeinen handelt es sich um leichte und vorübergehende Erscheinungen, doch ist in dem einen oder anderen Fall eine zahnärztliche Behandlung erforderlich.

- Die Behandlungsdauer von 14 aufeinanderfolgenden Tagen keinesfalls überschreiten. Die zweiwöchige Unterbrechung zwischen den Anwendungzyklen (14 Tage) einhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Zahnaufhellung ist eine zahnärztliche Untersuchung erforderlich.
- Die Zahnaufhellung hat keinerlei Auswirkung auf Porzellankronen und Zahnteile.
- Nach der Aufhellbehandlung für den Zeitraum von mindestens 6 Stunden keine Tabakprodukte, keinen Kaffee oder Rotwein konsumieren.
- Nicht empfohlen während der Schwangerschaft. Hinsichtlich der Stillzeit einen Arzt befragen.
- Einen Kontakt mit anderem Gewebe als das des Zahns vermeiden.
- Säure Nahrung/Säfte können bei Aufnahme direkt nach der erfolgten Behandlung empfindliche Reaktionen hervorrufen.
- Bei Personen mit Paradontalerkrankung können Reizungen des Zahnfleischgewebes auftreten.
- Bei Auftreten einer Zahnfleischreizung oder Zahnpflichtigkeit vom Produktgebrauch absehen und den Zahnarzt befragen.

Stylo de blanchiment des dents



BlancOne® STICK est un traitement de blanchiment à domicile. Utilisé sur un cycle de deux semaines, il redonne brillance et éclat à votre sourire. Idéal pour l'élimination des taches de nicotine, café, thé, boissons et aliments colorants. Indiqué pour prolonger les résultats du blanchiment professionnel au fauteuil.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une fois par jour sur un cycle de 14 jours consécutifs, de préférence le soir avant d'aller au lit.

- 1) Se brosser les dents.
- 2) Enlever le capuchon et tourner la base du stylo dans le sens horaire (3-4 clics) pour humidifier la brosse à dents avec un peu de gel. (REMARQUE IMPORTANTE : il se peut que plusieurs clics soient nécessaires à la première utilisation pour rompre le dispositif d'involvabilité).
- 3) Appliquer le gel sur les dents et en frotter à fond la surface pendant 2 minutes. Durant cette phase, humidifier régulièrement la brosse à dents avec une nouvelle quantité de gel, en tournant la base dans le sens horaire, et réappliquer. Il faut généralement de 10 à 12 clics pour appliquer une quantité de gel suffisante pour le traitement de blanchiment.
- 4) Cracher le gel restant sans rincer et ne rien manger ni boire pendant 30 minutes.
- 5) Au terme du traitement, nettoyer la brosse à dents en silicone avec un mouchoir en papier et remettre le capuchon du stylo.

En cas d'utilisation du stylo comme traitement indépendant, en interrompre l'utilisation pendant 2 semaines au bout d'un cycle de 14 jours, puis répéter un deuxième cycle de 14 jours consécutifs. En cas d'utilisation du stylo pour le maintien du blanchiment, répéter un cycle de 14 jours, 3 mois après le premier.

AVERTISSEMENTS

- Émission de 6% d'H2O2.
- À ne pas utiliser sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- Ne vendre qu'à des professionnels de la santé dentaire. La première utilisation dans chaque cycle ne doit être effectuée que par des spécialistes de la santé dentaire ou, en cas de niveau de sécurité équivalent garanti, sous leur surveillance directe. Le produit sera ensuite fourni au patient pour lui permettre de compléter le cycle d'utilisation.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer soigneusement les yeux pendant plusieurs minutes et consulter un médecin.
- Ne pas ingérer de quantités supérieures à celles requises pour la procédure de blanchiment. L'ingestion de faibles quantités de produit n'est pas dangereuse, en cas d'ingestion plus importante consulter un médecin.
- Chez certains patients, le produit pourrait occasionner une sensibilité ou une irritation au niveau des gencives. Il s'agit généralement d'effets légers et transitoires mais dans certains cas le traitement du dentiste pourrait s'avérer nécessaire.
- À ne pas utiliser plus de 14 jours consécutifs ; il est recommandé d'interrompre le traitement pendant 2 semaines entre chaque cycle d'application (14 jours).

HDS



BLANCONE
STICK

Style de blanchiment des dents



PRÉCAUTIONS

- Il est nécessaire, avant le blanchiment, d'effectuer un examen dentaire.
- Le blanchiment n'a aucun effet sur les couronnes en porcelaine et les restaurations dentaires.
- Ne pas utiliser de produits à base de tabac ; ne pas boire de café ni de vin rouge après la procédure de blanchiment pendant au moins 6 heures.
- Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes. Pendant l'allaitement, consulter un médecin.

Lápiz blanqueador de dientes



BlancOne® STICK es un tratamiento blanqueador para realizar en casa.

Con un ciclo de dos semanas, restablece el brillo y la luminosidad de la sonrisa. Es ideal para quitar manchas de nicotina, café, té, comidas y bebidas pigmentadoras. Indicado para mantener por más tiempo los resultados del blanqueamiento profesional efectuado por un dentista.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una vez al día por un ciclo de 14 días consecutivos, preferentemente por la noche antes de acostarse.

- 1) Lavar los dientes con el cepillo.
- 2) Quitar el capuchón y girar la base del lápiz en sentido horario (3-4 pasos) para humedecer el cepillo con una cierta cantidad de gel. (NOTA IMPORTANTE: la primera vez que se utiliza pueden ser necesarios más pasos para romper el precinto de seguridad).
- 3) Dispensar el gel sobre los dientes y frotar a fondo la superficie durante 2 minutos. En esta fase humedecer con regularidad el cepillo con una nueva cantidad de gel, girando la base en sentido horario, y aplicarlo de nuevo. Normalmente se necesitan 10-12 pasos para dispensar una cantidad adecuada de gel del blanqueador en cada tratamiento.
- 4) Escupir el gel restante sin aclarar y no comer ni beber durante 30 minutos.
- 5) Al final del tratamiento, limpiar el cepillo de silicona con un pañuelo de papel y poner de nuevo el capuchón en el lápiz.

Si se utiliza como tratamiento independiente, después de un ciclo de 14 días hay que interrumpir el uso durante 2 semanas y luego repetir un segundo ciclo de 14 días consecutivos. Si se utiliza como mantenimiento, repetir un ciclo de 14 días 3 meses después del primero.

ADVERTENCIAS

- Liberación de un 6% de H2O2.
- No utilizar con menores de 18 años.
- Vender exclusivamente a odontólogos profesionales. En cada ciclo, el primer uso tiene que ser efectuado exclusivamente por parte de odontólogos profesionales o bajo su directa supervisión si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. Seguidamente se entregará al paciente para completar el ciclo de uso.

- Evitar todo contacto con los tejidos blandos.
- Los jugos de frutas ácidos pueden inducir fenómenos de sensibilidad si se consumen inmediatamente después del blanqueamiento.
- Utilizado en personas sufriendo de enfermedades periodontales, el producto puede irritar el tejido gingival.
- En caso de irritación de las encías o de sensibilidad dental, interrumpir el uso del producto y consultar a un dentista.

PRECAUCIONES

- Antes del blanqueamiento es necesario efectuar una visita odontológica.
- El blanqueamiento no afecta a coronas de porcelana ni a reconstrucciones dentales.
- No utilizar productos con tabaco; no beber café ni vino tinto durante por lo menos 6 horas después del proceso de blanqueamiento.
- No indicado para mujeres embarazadas. Durante la lactancia, consultar un médico.
- Evitar el contacto con tejidos que no sean los de los dientes.
- Comidas/jugos ácidos pueden causar sensibilidad si se consumen inmediatamente después del blanqueamiento.
- Puede manifestarse una irritación del tejido gingival si se utiliza el producto con personas con patologías periodontales.
- Si se presenta irritación gingival o sensibilidad dental, interrumpir el uso del producto y acudir a un dentista.

www.blancone.eu



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

17100 Savona - Italy - Via Valletta San Cristoforo, 28/10
Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865 - www.idsdental.it

